

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51100-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

DL P 27-8-73 570369

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL 30 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W
Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 155 d'AOUT 1973

N° 21/23 août 1973

ARBORICULTURE FRUITIERE

Carpocapse des pommes :

Des captures importantes de papillons de 2ème vol ont été faites à l'aide de pièges "Phérotrop" le 14- 17 - 21 août en zone de pré-vergers non traités.

Un traitement est préconisé dès réception de cet avis dans les seuls vergers situés à proximité immédiate d'arbres de plein vent (pommiers non traités ou abandonnés).

Araignées rouges :

Des foyers existent dans certaines plantations, ceux-ci semblent s'étendre à la faveur des températures actuelles. L'emploi d'un acaricide spécifique est recommandé sur ces foyers ; les traitements dits "d'assurance" sont à proscrire dans les vergers reconnus sains.

- tenir compte du délai d'emploi des insecticides en fonction de la date de récolte.

GRANDE CULTURE

Altise à tête dorée ou grosse altise du colza d'hiver :

Après avoir marqué une régression au cours des dernières années ce parasite se manifeste à nouveau. Localement des populations importantes d'insectes parfaits ont pu être observées au cours de la récolte, dans les trémies des moissonneuses-batteuses.

Dans les secteurs où les altises ont été remarquées en abondance et afin d'éviter de sérieux dégâts sur les jeunes semis au stade cotylédonnaire, il est conseillé de ne semer que des graines traitées contre ce parasite.

Les semences devront avoir reçu, par enrobage, 45 g de lindane matière active par kg.

Si les semences sont fournies traitées s'assurer auprès du fournisseur que la dose préconisée a bien été respectée. En effet une dose plus faible risque d'assurer une protection insuffisante et surtout plus courte.

Malgré l'emploi d'adhésifs les produits utilisés à forte dose pour l'enrobage des graines de colza ont tendance à se désolidariser des

semences et à s'accumuler au fond des sacs, surtout si le traitement a été effectué longtemps à l'avance. Réaliser donc de préférence ce travail à la ferme, peu avant le semis.

Afin d'augmenter la rétention sur les graines ajouter une cuillerée à café d'huile de table, de pétrole ou de fuel par kilogramme de semence.

Il est rappelé que le traitement des semences à l'égard de l'altise à tête dorée doit être surtout considéré comme un procédé de sauvegarde des jeunes semis contre une pullulation brutale et intense des insectes parfaits. En effet dans les meilleures conditions le traitement n'est efficace que jusqu'au stade 1-2 feuilles du colza, alors que des altises peuvent encore arriver sur les cultures et y évoluer sans entrave.

Le traitement de base contre l'altise à tête dorée reste celui à effectuer à l'automne alors que la majorité des insectes sont arrivés sur les cultures, la période de ponte active n'étant pas encore commencée.

Cercosporiose de la betterave :

La situation a peu évolué et nous confirmons qu'il n'y a pas à envisager d'intervention contre cette maladie.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

H. de MEIRLEIRE.

A. GODIN.

Le Chef de la Circonscription
Phytosanitaire CHAMPAGNE,

J. DELATTRE.